



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)

AMIODARONA

Amiodarona é um antiarrítmico que prolonga a duração de potencial de ação e do período refratário no tecido cardíaco. Prolonga a condução AV e diminui a automaticidade dos disparos espontâneos nas fibras de Purkinje. A absorção gastrointestinal é lenta e variável (20 a 50%), pode ser administrada com a alimentação. Início de efeito, via oral, entre 2 a 3 dias a até 2 a 3 meses. A biotransformação é hepática e origina o metabólito ativo (desetilamiodarona). A excreção é biliar.

INDICAÇÕES:

Amiodarona é indicada nos estados de arritmias ventriculares e supraventriculares, quando não há resposta aos tratamentos convencionais.

DOSE:

Adulto: Arritmia ventricular: via oral, dose de ataque de 800 a 1600mg/dia, durante 1 a 3 semanas, manutenção: 400mg/dia. Arritmia supraventricular: via oral, dose de ataque entre 600 a 800mg/dia, durante 1 semana. Manutenção: 200 a 400mg/dia.

Criança: dose de ataque: via oral, 10mg/kg/dia durante 10 dias. Manutenção: 2,5mg/kg/dia.

REAÇÕES ADVERSAS:

Reações adversas mais freqüentes: neurotoxicidade, depósitos córneos assintomáticos de pigmentação marron-amarelado, alterações gastrointestinais, pneumonite intersticial, alveolite, constipação e cefaléia.

PRECAUÇÕES:

- Suspender o uso na ocorrência de sintomas de toxicidade pulmonar.
- Proteger a pele da luz solar durante o tratamento e vários meses após a suspensão do uso: pode ocorrer queimaduras.

INTERAÇÕES:

O uso concomitante com outros antiarrítmicos aumenta o risco de taquiarritmias. Com anticoagulantes derivados da cumarina inibe o metabolismo e potência desses anticoagulantes. Os bloqueadores beta-adrenérgicos ou dos canais de cálcio potencializam bradicardias. A Amiodarona aumenta a concentração sérica da digoxina e outros glicosídeos cardiotônicos. Associação com diuréticos aumenta o risco de arritmias por hipopotassemia.

CONTRA-INDICAÇÃO:

A Amiodarona é contra-indicada em bloqueio auriculoventricular preexistente, Pneumonite, Fibrose pulmonar. Bradicardia por disfunção grave do nódulo sinusal, exceto se controlada por marcapassos.