



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma

CETIRIZINE DI HCL

IDENTIFICAÇÃO

Fórmula Molecular: C₂₁H₂₅ClN₂O₃, 2HCL

PM: 461,8

DCB: 01949

CAS: 83881-52-1

PROPRIEDADES:

É metabólito da hidroxizina. Complexa-se preferencialmente com os receptores H₁, periféricos em vez de com os SNC, como o fazem também astemizol, loratadina e terfenadina.

Causa broncodilatação suave e também bloqueia a broncoconstrição induzida pela histamina em pacientes asmáticos. Tem, por isso, ação anti-asmática.

INDICAÇÃO

O produto está indicado para o tratamento da rinite alérgica, conjuntivite alérgica, urticária e outras afecções alérgicas.

DOSE E USO

Adultos e crianças a partir de 12 anos: 10 mg, uma vez ao dia.

Crianças de 6 a 12 anos: 10 mg, 5 mg pela manhã e à noite.

Crianças de 2 a 6 anos: a segurança do uso não está completamente estabelecida. Exclusivamente a critério médico, podem ser prescritos 5 mg, 2,5 mg pela manhã e à noite.

Idosos: até o presente momento não existem dados que determinem a necessidade de se reduzir as doses nos pacientes idosos. Nos pacientes com insuficiência renal, a dose a ser administrada deve ser reduzida à metade da posologia usual.

REAÇÕES ADVERSAS

As reações adversas são ocasionais, de intensidade leve e transitórias, incluindo sonolência, dor de cabeça, tontura, agitação, boca seca, enjoos e desconforto gastrointestinal. Em alguns pacientes podem ocorrer reações de hipersensibilidade, incluindo reações dermatológicas e angioedema. O dicloridrato de Cetirizina deve ser suspenso 48 horas antes de qualquer teste cutâneo, dado que os anti-histamínicos podem impedir ou diminuir as reações que, de outra forma, seriam positiva aos indicadores de reatividade dérmica.

PRECAUÇÕES

O uso concomitante com substâncias depressoras do sistema nervoso central deve ser feito com cuidado (vide Interações medicamentosas). Embora os estudos clínicos em voluntários saudáveis, ingerindo de 20 e 25 mg de dicloridrato de Cetirizina por dia, não revelarem efeitos sobre o estado de alerta ou o tempo de reação, os pacientes em tratamento com dicloridrato de Cetirizina devem ter cuidado ao dirigir ou operar máquinas até que estejam certos de que o medicamento não afeta o seu desempenho. Nos pacientes com insuficiência renal, a dose deve ser ajustada.



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma

INTERAÇÕES

A administração do dicloridrato de Cetirizina com a teofilina pode causar diminuição do clearance da Cetirizina, resultando em elevação nas concentrações séricas desta, podendo chegar a níveis tóxicos de Cetirizina. Além disto, o paciente pode apresentar sonolência, fadiga e boca seca.

E redução da dose de dicloridrato de Cetirizina pode ser requerida. Recomenda-se cautela no uso concomitante com depressores do sistema nervoso central. Assim como os demais anti-histamínicos, pacientes em tratamento com Cetirizina devem evitar a ingestão excessiva de álcool.

CONTRA-INDICAÇÕES

O dicloridrato de Cetirizina é contra-indicada para crianças menores de 2 anos.

REFERÊNCIA

DTC, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014

