



# Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600  
Brasil 0800 10 50 08



[www.purifarma.com.br](http://www.purifarma.com.br)



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)

## CIPROFLOXACINA

Ciprofloxacina é um fluorquinolônico sintético, bactericida que não apresenta resistência cruzada com as penicilinas, cefalosporinas, tetraciclinas e aminoglicosídeos. Atua por inibição do DNA-girase bacteriana. Interferindo na replicação do DNA. Na forma oral, combina uma biodisponibilidade elevada com grande penetração tissular que permite seu emprego como monoterapia ou em combinação com outros antibióticos.

### INDICAÇÕES:

Ciprofloxacina atua sobre os germes gram-positivos: *Staphylococcus aureus*, *pyogenes* e *pneumoniae*, *Streptococcus faecalis*, *Mycobacterium tuberculosis*. Microorganismos gram-negativos: *Escherichia coli*, *Klebsiellas*, *Enterobacter*, *Salmonella*, *Shigella*, *Proteus mirabillis*, *Pseudomonas*, *Haemophilus influenzae*, *Neisseiria gonorrhoeae*, *Aeromonas*, *Vibrium* *Brucella melitensis*. Ciprofloxacina tem indicação nos seguintes quadros clínicos: infecção no trato geniturinário, da pele e tecidos moles, infecções das vias respiratórias, gastrintestinais e infecções sistêmicas graves.

### DOSE:

Adulto: Gonorréia não complicada: 250 a 500mg, via oral, dose única. Demais infecções: 250 a 750mg, via oral, cada 12 horas, durante 7 a 10 dias.

### REAÇÕES ADVERSAS:

Reações mais freqüentes: distúrbios gastrintestinais e toxicidade do SNC (tonturas, cefaléia, insônia).

### PRECAUÇÕES:

- Ciprofloxacina pode ser administrado via oral em jejum ou junto com alimentos.
- Reduzir a posologia, de acordo com o valor da depuração da creatinina, em pacientes com comprometimento renal.
- Evitar a administração de antiácidos: defasar por 2 horas as ingestões orais de antiácidos e do antibiótico fluorquinolônico.
- Os fluorquinolônicos têm baixa atividade contra anaeróbios e não são efetivas no tratamento da sífilis.

### INTERAÇÕES:

O uso concomitante de antiácidos reduz a absorção do fluorquinolônico. O Ciprofloxacino pode causar aumento de até 50% das concentrações séricas de teofilina.

### CONTRA-INDICAÇÕES:

Ciprofloxacina é contra-indicada a pacientes com hipersensibilidade à droga e outros fluorquinolônicos. Gravidez, lactação e crianças.