



**Purifarma**



São Paulo (11) 2067.5600  
Brasil 0800 10 50 08



[www.purifarma.com.br](http://www.purifarma.com.br)



grupopurifarma



Purifarma

## CIPROHEPTADINE CLORIDRATO SESQUIHIDRATADO

### IDENTIFICAÇÃO

**Fórmula Molecular:** C<sub>21</sub>H<sub>21</sub>N.HCl.1.1/2 H<sub>2</sub>O

**PM:** 350,9

**DCB:** --

**CAS:** 41354-29-4

### PROPRIEDADES:

A Ciclohepadine é um anti-histamínico H<sub>1</sub>, que tem estrutura análoga á dos fenotiazínicos, Possui também atividade antisserotonérgica. Além disso, tem fraca atividade anticolinérgica e apresenta leves propriedades depressoras centrais. Seus diversos mecanismos de ação estão relacionados com o antagonismo competitivo com os mediadores químicos (histamina, serotonina e acetilcolina) pelos respectivos receptores.

### INDICAÇÃO

- Tratamento sintomático de prurido associado com reações alérgicas.
- Tratamento de rinite alérgica perene ou sazonal.
- Tratamento de urticária fria.
- Tratamento de doença de Cushing e da síndrome de Nelson
- Tratamento de enxaqueca em crianças.
- Como antidiarréico na síndrome carcinóide.

### DOSE E USO

- Via oral, adultos, 4 a 20 mg ao dia em tomadas divididas; a dose deve ser individualizada e não exceder a 0,5 mg/kg por dia;
- Crianças de 07 a 14 anos, 4 mg duas vezes ao dia(máximo de 16 mg diariamente);
- Crianças de 02 a 06 anos, 2 mg duas ou três vezes ao dia (máximo de 12 mg diariamente).
- Via Oral: É preferível administrar com leite ou com as refeições.

### REAÇÕES ADVERSAS

- Típico de anti-histamínico, principalmente sedação e sonolência.
- Possível aumento do apetite
- Espessamento da secreção brônquica
- Dificuldade respiratória
- Dose excessiva em crianças pode provocar alucinações, depressão do SNC, convulsões e morte.

### PRECAUÇÃO

Orientar o paciente sobre o risco de acidentes ao operar máquinas e dirigir automóveis pelo efeito sedativo do medicamento.

### CONTRA-INDICAÇÕES

- Hipersensibilidade á Cicloheptadine e fármacos de estrutura análoga
- Prematuros e recém-nascidos
- Lactação
- Crises agudas de asma
- Pacientes com retenção urinária
- Pacientes tratados com inibidores da MAO



# Purifarma

- Glaucoma de ângulo fechado
- Úlcera péptica estenosante
- Hipertrofia prostática
- Obstrução do colo da bexiga
- Obstrução piloroduodenal
- Pacientes idosos debilitados

## INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

- Álcool e outros depressores do SNC podem produzir efeitos aditivos
- Amantadina, antimuscarínicos, fenotiazínicos, haloperidol ou procainamida podem potencializar os seus efeitos
- Inibidores da MAO podem intensificar ou prolongar seus efeitos anticolinérgicos.

## REFERÊNCIA

DTC, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014



São Paulo (11) 2067.5600  
Brasil 0800 10 50 08



[www.purifarma.com.br](http://www.purifarma.com.br)



grupopurifarma



Purifarma

