



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)

FLUOCINOLONA ACETONIDA

IDENTIFICAÇÃO:

Fórmula Molecular: C₂₄H₃₀F₂O₆

PM: 452,5

DCB: 04559 (Fluocinolona Acetonida)

CAS: 67-73-2

PROPRIEDADES:

O acetonido de fluocinolona é um corticóide de uso tópico que possui uma potente atividade terapêutica antiinflamatória, antiexsudativa e antipruriginosa. Inibe a migração e o acúmulo de material celular (leucócitos, macrófagos, células inflamatórias), a liberação de mediadores da inflamação, enzimas lisossomiais e a síntese de mediadores químicos e prostaglandinas. Seu sal acetonido outorga à fluocinolona uma excepcional atividade antiinflamatória local com a mesma atividade esteróide sistêmica.

INDICAÇÃO

Dermatite alérgica, dermatite de contato, dermatose, eczemas, psoríase, pruridos, lúpus eritematoso discoidal, alopecia areata.

DOSE E USO

Uso Tópico. Aplicar uma fina camada sobre a região afetada e repetir duas a quatro vezes ao dia. Pode ser utilizada uma compressa oclusiva (película plástica) para certas afecções como a psoríase e outras patologias dermatológicas. Se houver desenvolvimento de alguma infecção, deve-se suspender o uso da compressa oclusiva e iniciar o tratamento antimicrobiano adequado.

REAÇÕES ADVERSAS

• Podem ocorrer reações locais: sensação de calor, prurido, irritação, ressecamento, foliculite, hipertricose, erupções acneiformes, hipopigmentação, dermatite peitoral, dermatite alérgica por contato, maceração da pele, infecção secundária, emagrecimento, atrofia e estrias da pele, dilatação capilar.

PRECAUÇÃO

Em alguns pacientes, a absorção sistêmica dos corticóides tópicos pode causar supressão reversível do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, síndrome de Cushing, hiperglicemia e glicosúria. A aplicação prolongada, em áreas amplas, e as compressas oclusivas favorecem o incremento da absorção sistêmica do corticóide. Recomenda-se não aplicar em crianças menores de dois anos. O uso durante a gravidez está restringido a um curto período de tempo e a áreas reduzidas da pele.

CONTRA-INDICAÇÕES

Pacientes com antecedentes de hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula. Dermatites fúngicas ou virais, acne rosácea, dermatites infectadas.

REFERÊNCIA

DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014