



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma

MAPROTILINA HCL (C1)

IDENTIFICAÇÃO

Fórmula Molecular: C₂₀H₂₃N.HCL

PM: 313,9

DCB: 05499

CAS: 10347-81-6

PROPRIEDADES:

Quimicamente, corresponde a derivado do etano-antraceno (composto tetracíclico) com cadeia lateral propanamínica. Assemelha-se à imipramina na eficácia e nos efeitos farmacológicos e clínicos. Atua por bloqueio e captação neuronal da norepinefrina, mais do que a da serotonina. É usada a forma de cloridrato.

INDICAÇÃO

- Tratamento de pacientes com distúrbios distímicos ou distúrbio afetivo bipolar
- Alívio de ansiedade associada com depressão
- Tratamento de algum tipo de dor crônica

DOSE E USO

- Adultos hospitalizados, via oral, inicialmente, 100 a 150 mg por dia em tomadas divididas, gradualmente aumentadas se necessário e se forem tolerada ; em certos casos , a dose eficaz chega a 225 mg, dose máxima;
- Adultos não hospitalizados, via oral, inicialmente 75 mg por dia em dose única ou dividida, durante duas semanas. Caso necessário, na terceira semana pode-se aumentar paulatinamente a dose (em 25 mg na diária total a cada semana), até melhora clínica, aparecimento de efeitos adversos intoleráveis, ou atingir dose diária dose diária máxima(225 mg) para manutenção, recomenda-se a dose mínima eficaz.
- Idosos, inicialmente, 25 a 50 mg diariamente; para manutenção, 50 a 75 mg por dia
- Não se determinou a dose para crianças até 18 anos.

REAÇÕES ADVERSAS

- Sonolência e efeitos anticolinérgicos são os mais comuns, podendo causar xerostomia, sobretudo nos pacientes de meia-vida ou idosos, resultando na erosão da gengiva e dentes naturais.
- Agranulocitose, ginecomastia em homens e mulheres, tumefação dos testículos, impotência, diminuição ou aumento de libido.
- Exantemas, rubor, edema e prurido.
- Alucinações, confusão, hipotensão.
- Efeitos cardiotóxicos.

PRECAUÇÕES

Deve-se levar em consideração a relação risco/benefício quando existem os seguintes problemas médicos; alcoolismo ativo, asma, discrasias sanguíneas, distúrbios bipolar, distúrbios cardiovasculares, distúrbios gastrintestinais, esquizofrenia, glaucoma do ângulo fechado, hipertireodismo, hipertrofia prostática, infarto do miocárdio, insuficiência hepática, pressão intraocular aumentada, retenção urinária.



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma

CONTRAINDICAÇÕES

- Hipersensibilidade á Maprotilina ou antidepressivos tricíclicos
- Pacientes com crises convulsivas, incluindo epilepsia.
- Gravidez
- Lactação
- Lactentes
- Fase aguda de infarto do miocárdio

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

- Pode diminuir os efeitos anti-hipertensivos da clonidina
- Álcool, anti-hipertensivos com efeitos depressores sobre o SNC podem potencializar seus efeitos depressores sobre o SNC.
- Anti-histaminico e antimuscarínicos podem potencializar os efeitos antimuscarínicos de ambas as classes de fármacos ou da maprotilina
- Hormônios tireoidianos podem aumentar a possibilidade de arritmias cardíacas
- Inibidores da MAO acarretar crises hipertensivas e até morte
- Simpatomiméticos podem potencializar os efeitos cardiovasculares.

REFERÊNCIA

DTC, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014.

