



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)

METILDOPA

Metildopa é um agente anti-hipertensivo cuja a ação é provavelmente devida à sua biotransformação para alfa-metilnorepinefrina, que diminui a pressão arterial por estimulação dos receptores alfa 2-adrenérgicos centrais, forma os falsos neurotransmissores, e/ou reduz a atividade da renina plasmática. A absorção gastrointestinal é variável, aproximadamente 50%, ligação proteica é baixa, a biotransformação é hepática, excreção é renal, a Metildopa oral não absorvida é excretada na forma inalterada nas fezes.

INDICAÇÕES:

Metildopa é indicada em pacientes com hipertensão arterial moderada a severa.

DOSE:

Adulto: início: via oral, 250mg 2 ou 3 vezes/dia, nas primeiras 48 horas. A seguir, a posologia diária pode ser aumentada ou diminuída a intervalos de pelo menos 2 dias, até que se obtenha uma resposta adequada. Para minimizar a sedação, iniciar o aumento da posologia à noite. Manutenção: a dose diária usual de Metildopa é 500mg à 2g fracionados em 2 a 4 vezes.

REAÇÕES ADVERSAS:

Reações mais frequentes: edema periférico, febre, depressão ou ansiedade; náuseas, vômito, anemia hemolítica, lupo eritematoso.

PRECAUÇÕES:

- A Metildopa diminui ou inibe o fluxo salivar, o que contribui para o desenvolvimento de cáries, doenças periodontais e candidíase oral.
- Pode ocorrer tolerância após 2 a 3 meses de terapia. A adição de um diurético, ou aumentando a dose de Metildopa, restabelece-se o controle da pressão.
- O uso de Metildopa pode provocar anemia hemolítica Coombs positivo. Neste caso, suspender a medicação até a remissão da anemia.

INTERAÇÕES:

Quando a Metildopa e o lítio são administrados concomitantemente, o paciente deve ser cuidadosamente controlado quanto aos sintomas de toxicidade por lítio. Metildopa em combinação com outros medicamentos anti-hipertensivos, pode ocorrer potencialização da ação anti-hipertensiva.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Metildopa é contra-indicada em pacientes com doença hepática ativa (cirrose, hepatite).