



# Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600  
Brasil 0800 10 50 08



[www.purifarma.com.br](http://www.purifarma.com.br)



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)

## NAPROXENO

O Naproxeno, é um antiinflamatório não esteróide (AINE), inibidor da enzima cicloxigenase, ocasionando inibição da síntese de prostaglandinas em nível central e periférico. A absorção gastrointestinal é rápida; a ligação protéica é muito alta. O início do efeito analgésico é 1 hora. A duração do efeito analgésico é até 7 horas. O efeito máximo na gota é atingido entre 1 a 2 dias e na dor entre 2 a 4 horas. A biotransformação é hepática e excreção renal.

### INDICAÇÕES:

Naproxeno é indicada nas dores associadas à inflamação e às doenças neoplásicas metastáticas. Inflamações não reumáticas (bursite, capsulite, sinovite, tendinite). Disminorréia, cefaléia e enxaqueca, Doenças reumáticas (artrite reumatóide, osteoartrite, artrite juvenil). Artrite gotosa e febre.

### DOSE:

Adulto: doenças reumáticas: via oral, 250 a 500mg (base), 2 vezes/dia. Nas exarcebações agudas, a dose pode ser aumentada até 1,5g/dia, por períodos limitados. Antigota: via oral, dose inicial de 750mg, diminuir para 250mg cada 8 horas até que o ataque diminua. Criança: doença reumática: via oral, 10mg/kg/dia (base) fracionados em 2 vezes.

### REAÇÕES ADVERSAS:

Reações mais freqüentes: urticária, exantema, retenção de líquidos, dispnéia, tontura, sonolência, cefaléia, cólicas estomacais ou abdominais, constipação, e náusea.

### PRECAUÇÕES:

- Ingerir com bastante água. A presença de alimentos e de antiácidos contendo alumínio ou magnésio diminui a absorção gastrointestinal.

- A melhora dos sintomas na artrite podem ocorrer dentro de 2 semanas, mas a eficácia máxima do Naproxeno é atingida entre 2 a 4 semanas após o uso contínuo.

### INTERAÇÕES:

O uso concomitante de ácido acetilsalicílico aumenta o risco de hemorragias, devido a inibição plaquetária. Com medicamentos fotossensibilizantes causa efeito aditivo na fotossensibilidade.

### CONTRA-INDICAÇÃO:

O Naproxeno é contra-indicado nos pólipos nasais associados com broncoespasmo, angioedema, anafilaxia ou outras reações alérgicas graves.