



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)

RAMIPRIL

O Ramipril é um anti-hipertensivo que atua como inibidor da enzima conversora da angiotensina. É convertido no organismo a ramiprilato, substância ativa que inibe competitivamente a enzima conversora de angiotensina I, resultando em diminuição dos níveis de angiotensina II, que é um vasoconstritor potente. A absorção gastrointestinal é 50%. O alimento retarda mas não diminui a quantidade absorvida. O pico do efeito hipotensor está entre 4 a 6,5 horas. A biotransformação é hepática e excreção renal (60%) e fecal (40%).

INDICAÇÕES:

O Ramipril é indicado em pacientes com hipertensão arterial e na Insuficiência cardíaca congestiva (adjuvante vasodilatador)

DOSE:

Dose inicial recomendada é de 2,5mg, via oral, 1 vez ao dia. Conforme a necessidade, a dose pode ser aumentada de 2,5 a 20mg, em dose única ou fracionada em 2 vezes. Segurança e eficácia em crianças ainda não foram definidas.

REAÇÕES ADVERSAS:

Reações mais freqüentes: tosse seca persistente e cefaléia. Reações ocasionais: diarreia, perda do paladar, fadiga e náusea.

PRECAUÇÕES:

- Pode haver demora de semanas para que seja atingido o efeito terapêutico pleno.
- Usar doses menores em tratamento prévio com digitálicos ou diuréticos.
- Há aumento dos riscos de desidratação e hipotensão durante exercícios físicos, em dias quentes ou na presença de diarreia ou vômito.

INTERAÇÕES:

A administração de diuréticos poupadores de potássio pode aumentar o risco de hiperpotassemia devido à reduzida secreção de aldosterona. Em pacientes medicados com compostos de lítio, a administração de Ramipril pode ocasionar um aumento da litemia. Tetraciclina ou medicamentos que interagem com magnésio podem reduzir a absorção de Ramipril.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Ramipril é contra-indicado para mulheres gestantes, durante o período da amamentação e aos pacientes com hipersensibilidade à droga.