



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 0258 825



www.purifarma.com.br



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)



purifarma.com.br/Blog

TRIMEBUTINA MALEATO

Identificação:

CAS: C₂₆H₃₃NO₉

PM: 503,54

DCB: 08910 (Maleato de Trimebutina)

CAS: 34140-59-5

Fator de correção: Aplicável

Uso: Oral

Propriedades:

É um éster benzoato, um espasmolítico musculotrópico que age diretamente sobre a musculatura lisa. É um antagonista do cálcio. Além disso, exerce ação analgésica e reguladora da atividade intestinal anormal acelerando o esvaziamento gástrico e modulando a atividade contrátil do intestino. Sua ação mais específica é sobre o trato digestivo.

Indicação:

- Síndrome do intestino irritável
- Dislepsia
- Íleo paralítico no pós-operatório
- Processos inflamatórios anais
- Fissura anal

Dose e Uso:

Via oral, 400 a 600 ao dia, em duas ou três tomadas. A dose máxima recomendada é de 600 mg

Reações adversas:

- Sensação de queimação local, eritema cutâneo
- Sonolência, Cefaleia, tontura e fraqueza
- Boca seca, constipação, diarreia, náuseas, vômitos
- Leucopenia

Contraindicações:

- Hipersensibilidade ao fármaco
- Primeiro trimestre de gravidez
- Menores de 12 anos



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 0258 825



www.purifarma.com.br



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)



purifarma.com.br/Blog

Precauções:

- Vigiar a administração durante a gravidez
- Evitar uso concomitante com bebidas alcoólicas

Interações medicamentosas:

Com alimentos: Não existem relatos a respeito de interações medicamentosas de trimebutina na forma oral com alimentos. Entretanto, é recomendável que o paciente siga as orientações médicas quanto à dieta alimentar.

Em exames laboratoriais: Em estudos clínicos de eficácia e segurança comparativos entre Trimebutina e outros fármacos, nenhuma interferência significativa foi observada quanto aos parâmetros bioquímicos, exceto diminuição da contagem de eritrócitos. Relato de leucopenia também pode ocorrer.

Com outros medicamentos: Não existem relatos a respeito de interações medicamentosas com Trimebutina.

Com álcool: Pacientes que estiverem fazendo tratamento com Trimebutina devem evitar o uso simultâneo de bebidas alcoólicas.

Sugestões de Fórmulas:

Trimebutina Cápsulas	
Composição	Quantidade
Maleato de Trimebutina	200 mg
Excipiente	1 cápsula
Mande cápsulas	

Trimebutina Pó para Suspensão Oral (100 mg/ 15ml)	
Composição	Quantidade
Maleato de Trimebutina	1g
Mande em frasco calibrado para 150 ml após reconstituição.	

Referências:

DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014. Informações bula disponibilizada pela Anvisa
BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/ SP: Atheneu, 5ª Ed. 2015