



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma

VALSARTAN

O Valsartan é um moderno derivado dos antagonistas da angiotensina II como o losartan, desenvolve um gradual, eficiente e prolongado efeito anti-hipertensivo sistólico e diastólico. É um antagonista competitivo da angiotensina II que compete sobre o subtipo de receptores AT1 localizado preferencialmente nas células musculares lisas vasculares. Sabe-se que a angiotensina II estimula a abertura dos canais de cálcio e bloqueia os canais de potássio. O Valsartan, por seu efeito específico e seletivo, não afeta a frequência cardíaca. Após sua administração por via oral, sua biodisponibilidade é de 23% aproximadamente, ligado às proteínas séricas em uma elevada concentração. O início da atividade anti-hipertensiva ocorre dentro de um intervalo de 2 horas e a máxima normalização tensional ocorre entre 2 a 4 semanas. 30% do Valsartan disponível sistêmico são excretados pela urina e 70% pela biliar, na forma inalterado.

INDICAÇÕES:

Valsartan é indicada no tratamento da hipertensão arterial leve a moderada de diferente etiologia.

DOSE:

A dose média aconselhada é de 80mg em uma única tomada diária. Os indivíduos que não respondem ou cuja pressão arterial não é adequadamente controlada podem ser medicados com 160mg diários associado o fármaco a um diurético tiazídico.

REAÇÕES ADVERSAS:

Reações adversas freqüentes: tonturas, náuseas, fadiga, diarreia, dor abdominal, rinite.

PRECAUÇÕES:

- Pacientes com depleção salina severa podem apresentar caso de hipotensão sintomática após iniciado o tratamento com Valsartan. Aconselha-se corrigir a depleção de volume ou sódio ou reduzir as doses dos diuréticos antes de iniciar a medicação.

- Não é necessário um ajuste posológico em indivíduos com alteração da função renal ou em pacientes com insuficiência hepática sem colestase.

INTERAÇÕES:

O uso simultâneo do Valsartan com diuréticos poupadores de potássio (amilorida, espironolactona) ou suplemento de potássio pode produzir hiperpotassemia.

CONTRA-INDICAÇÃO:

Valsartan é contra-indicada em pacientes hipersensíveis ao fármaco, crianças e mulheres gestantes e lactantes.