



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma

VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA)

A vitamina B12 faz parte de vários sistemas enzimáticos (oxidases e desidrogenases); participa ativamente como coenzima (FAD, FMN) em pelo menos 3 processos envolvidos na produção de energia, como acceptor e transportador de H. Sua ação é diminuída pelos antidepressivos tricíclicos, antineoplásicos, fenotiazinas, antibióticos e pelo probenecide. Sua presença é importante na oxidação dos aminoácidos, na síntese e oxidação dos ácidos graxos, na oxidação da glicose e no metabolismo dos hormônios tireoideanos. As necessidades de vitamina B2 aumentam nas queimaduras, cirurgias, febre, tuberculose, alcoolismo e diabete mérito descompensado.

SINÔNIMOS: Lactoflavin; Riboflaviini; Riboflavina; Vitamin B2; 3,10-Dihidro-7,8-dimethyl-10-(d-ribo-2,3,4,5-tetrahydropentyl)benzopteridine-2,4-dione.

CAS: 83-88-5.

P.M: 376.4

INDICAÇÕES: Estados carentes de riboflavina como consequência de uma nutrição inadequada. É rara a deficiência de uma só vitamina B, pois acaba causando deficiências múltiplas a ingestão de uma dieta inadequada.

DOSES: A dose diária ideal é de 0,40mg/kg de peso corporal. Doses de 100mg a 200mg/dia são utilizadas no Parkinsonismo.

USO DA VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA): A vitamina B12 é empregada no alcoolismo, dermatites, prevenção da catarata, stress, fadiga crônica e acne.

REAÇÕES ADVERSAS: Dificilmente produz toxicidade em pessoas com função renal normal. As doses elevadas de riboflavina podem produzir uma cor amarela na urina. A deficiência de riboflavina pode originar dermatose, queilose, estomatite angular, vascularização corneana.

PRECAUÇÕES: É importante não ultrapassar a porção dietética recomendada no caso de automedicação com vitamínicos. Não utilizar vitaminas como substitutos de uma dieta equilibrada. As megadoses não são recomendadas.

INTERAÇÕES: A probenecida diminui a absorção gastrointestinal da riboflavina. O álcool modifica a absorção intestinal da riboflavina. Os antidepressivos tricíclicos e as fenotiazinas, prescritos simultaneamente, obrigam o aumento da dose de riboflavina nestes pacientes.

CONTRA-INDICAÇÕES: Não foram descritas situações clínicas que contra-indiquem seu uso.

INCOMPATIBILIDADES: (substâncias)

C: causa R: recomendação

Incompatibilidade com Substâncias:

1. Carbonato de cálcio. C: Redução da atividade ou inativação da vitamina. R: Não associar.
2. Carbonato de sódio. C: redução da atividade ou inativação da vitamina. R: Não associar.

REFERÊNCIAS

1. CAVALCANTI, Luiz Carlos. Incompatibilidades Farmacotécnicas na Farmácia



Purifarma

Magistral: causa, recomendação e uso terapêutico. Pharmabooks: São Paulo, 2006.

2. Martindale: The Complete Drug Reference. 35. Ed. PhP: Londres, 2007.

3. MOURA, José Gilberto. Nutrientes e Terapêutica: como usá-los, quando usá-los, como avaliar suas carências, radicais livres na saúde. Visão Artes: Rio Grande do Sul, 2006.

4. Disponível no site <http://www.prvademecum.com> (em 10/03/2008)



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma

