



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 0258 825



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma



purifarma.com.br/Blog

Sugestões de Fórmulas

Suspensões para úlceras bucais

Componentes	Quantidades
Hidrocortisona	55,2 mg
Lidocaína HCL	2,4 g
Eritromicina (estolato ou estearato)	1,5 g
Cloridrato de Difenidramina	150 mg
Nistatina	2.000.000 UI
Flavorizante	Qs
Xarope simples qsp	120 ml
Modo de usar: aplicar 1 a 2 ml na mucosa oral e manter em contato por algum tempo e bochechar, 4 vezes ao dia.	

Anestésicos Tópicos

Componentes	Quantidades
Lidocaína HCL	2 a 5%
Creme ou gel qsp	20 g
Modo de usar: aplicar e ocluir por 1 hora, antes do procedimento cirúrgico.	

NOTA1: Os principais veículos para a Lidocaína HCL são água e propilenoglicol.

NOTA2: Todas as sugestões de fórmulas devem ser testadas e o desenvolvimento da farmacotécnica mais adequada ao processo da farmácia deve ser validada pelo farmacêutico (a) responsável pela manipulação.

Referências:

1. Material técnico do fabricante.
2. BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/ SP: Atheneu, 6ª Ed. 2021.
3. FERREIRA, ANDERSON, et.al. GUIA PRÁTICO DA FARMÁCIA MAGISTRAL. 5ª ed. Juiz de Fora: Editar, 2018.

Rev.1 - 31/03/2022 SAC/RT.PE