



Purifarma

MICONAZOL

O miconazol é um derivadoimidazol, inibe a síntese de ergosterol, composto necessário para a manutenção da integridade da membrana fúngica.

INDICAÇÃO

Alesqueriose; - Candidíase disseminada e mucocutânea crônica; - Coccidioidomicose, medicamento de 2º escolha; - Criptococose, medicamento de 2º escolha; - Paracoccidioidomicose, medicamento de 2º escolha; - Septicemia fúngica; - Candidíase oral e intestinal.

Uso tópico

Candidíase cutânea; - Paroníquia; - Tinea barbae, capitis, corporis, cruris, pedis; - Tinea versicolor.

Uso vaginal

Candidíase vulvovaginal (o tratamento em mulheres grávidas só poderá ser realizado no 2º e 3º trimestres de gravidez).

DOSE

Uso sistêmico

Adultos:

- Doses usuais para infusão intravenosa, 200 mg a 1,2 g em 3 infusões intravenosas:

Dose/dia	Duração do tratamento (semanas)	
Alesqueriose	600mg a 3g	5 a mais de 20
Candidíase	600mg a 1,8g	1 a mais de 20
Coccidioidomicose	1,8 a 3,6g	3 a mais de 20
Criptococose	1,2 a 2,4g	3 a mais de 12
Paracoccidioidomicose 200mg a 1,2g		2 a mais de 16

- Candidíase oral e intestinal: via oral, 125 a 250mg 4 vezes/dia.

(Usa-se 20 mg pela via intratecal de miconazol injetável não-diluído, dose única, cada 3 a 7 dias como adjuvante no tratamento da meningite fúngica com o miconazol i.v.)

(Usa-se 200 mg de miconazol injetável diluído; via intravesicular, por instilação ou irrigação contínua como adjuvante no tratamento de infecções fúngicas da bexiga. A instilação pode ser feita em 2 ou 3 vezes/dia ou por irrigação contínua).

Crianças

- Doses usuais:

Até 1 ano: dose não definida. Doses entre 3 a 50mg/kg/dia (a maioria dos



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma

recém-nascidos foi tratada com 15 a 30mg/kg/dia), fracionada em 3 ou 4 vezes já foram usadas.

Acima de 1 ano: infusão intravenosa, 20 a 40mg/kg/dia. Não ultrapassar de 15 mg/kg em cada dose.

- Candidíase oral e intestinal:

Até 2 anos de idade: via oral, 62,5 mg 2 vezes/dia;

De 2 a 6 anos: via oral, 125 mg 2 vezes/dia;

Acima de 6 anos: via oral, 125 mg 4 vezes/dia;

Dissolver o comprimido na boca no caso de candidíase oral.

(O miconazol injetável não deve ser misturado com nenhum tipo de medicamento).

Uso tópico

Adultos e crianças:

- Candidíase cutânea, Tinea barbae, capitis, corporis, cruris, pedis: aplicar na área afetada e ao seu redor 2 vezes/dia, manhã e tarde.

- Tinea versicolor: aplicar na área afetada e ao seu redor 1 vez/dia.

Uso vaginal

Intravaginal, 1 aplicador com creme vaginal 2%/dia ao deitar durante 7 a 14 dias podendo repetir se necessário ou;

Intravaginal, 100 mg/dia (óvulo) ao deitar durante 7 dias podendo repetir se necessário ou;

Intravaginal, 200 ou 400mg/dia (óvulo) ao deitar durante 3 dias podendo repetir se necessário ou;

Intravaginal, 100 mg/dia (1 tampão) ao deitar durante 5 dias; o tampão vaginal deve permanecer durante a noite e removê-lo na manhã seguinte.

PRECAUÇÕES

Uso sistêmico

- A administração rápida do miconazol injetável pode causar taquicardia, arritmia, parada respiratória e/ou anafilaxia. A infusão intravenosa deve ser administrada na velocidade de 200 mg em 2 horas.

- Em meningite fúngica, a infusão intravenosa deve ser reforçada com a administração intratecal a fim de atingir concentrações eficazes. As injeções intratecais devem ser alternadas entre as regiões lombar, cervical e cisternica cada 3 a 7 dias.

- No tratamento de infecções fúngicas de bexiga, o tratamento pela via i.v. deve ser reforçado com a irrigação ou instilação intravesicular a fim de aumentar a eficácia.

- O risco/benefício deve ser avaliado na gravidez.

Usos tópico e vaginal

- Os tratamentos de candidíase, tinea, cruris e tinea corporis devem durar pelo menos 2 semanas e o de tinea pedis 1 mês a fim de reduzir a recorrência das infecções.

- Evitar o uso de roupas justas/oclusivas durante o tratamento da candidíase a fim não facilitar o desenvolvimento do fungo e a liberação de endotoxinas irritantes.

- Suspender o tratamento no caso de irritação/sensibilização.



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma

- O risco/benefício deve ser avaliado na hipersensibilidade ao iconazol.

REAÇÕES ADVERSAS

Uso sistêmico

- Reações mais frequentes: flebite (rubor, inchaço, dor no local da injeção).

- Reação ocasional: rubor facial epidérmico.

- Risco na gravidez (FDA): categoria C.

Usos tópico e vaginal

- Reações ocasionais/raras: irritação vaginal, coceira ou outra irritação não presente antes da terapia, cólicas ou dores estomacais ou abdominais, irritação ou coceira no órgão sexual do parceiro, cefaléia.

- Risco na gravidez (FDA): categoria B (uso vaginal)

CONTRA-INDICAÇÃO

Hipersensibilidade aos antifúngicos azol-derivados de uso sistêmico.

